

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje teikiamos šios, LR Vyriausybės nutarimais ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais reglamentuojamos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis finansuojamos nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

I. NEMOKAMOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ASMENIMS, APDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU IR PRISIRAŠIUSIEMS PRIE ĮSTAIGOS:

- 1.1. Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo paslaugos;
- 1.2. Bendruomenės, bendrosios praktikos, slaugos paslaugos;
- 1.3. Akušerės paslaugos;
- 1.4. Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos: gydytojo odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo paslaugos;
- 1.5. Profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai;
- 1.6. Vaikų ir suaugusiųjų privalomas skiepijimas;
- 1.7. Pacientų slaugymas namuose;
- 1.8. Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
- 1.9. Siuntimų į neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;
- 1.10. Išrašų iš medicininės dokumentacijos ir kitų medicininių pažymų pildymas, kai ši paslauga susijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu;
- 1.11. Elektrokardiogramų užrašymas;
- 1.12. Šeimos gydytojas, diagnozuodamas ir gydydamas ligas, būkles ir sveikatos sutrikimus skiria ligonio ištyrimą ir užtikrina šiuos nemokamus tyrimus:
 - 1.12.1. bendrą šlapimo tyrimą ir albumino / kreatinino santykį šlapime;
 - 1.12.2. bendrą kraujo tyrimą;
 - 1.12.3. biocheminius kraujo tyrimus: lipidų apykaitos tyrimą (lipidogramą); kalio; natrio; kreatinino; alanininės aminortransferazės; asparagininės aminortransferazės; šarminės fosfatazės; bilirubino; gliukozės; šlapimo rūgšties;
 - 1.12.4. skydliaukės funkcijos tyrimą (tirotropinį hormoną (TTH));
 - 1.12.5. uždegimo rodiklius (C reaktyvinį baltymą, eritrocitų nusėdimo greitį (ENG));
 - 1.12.6. gliukozės tolerancijos testą;
 - 1.12.7. prostatos specifinį antigeną pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo;
 - 1.12.8. koprogramą;
 - 1.12.9. ginekologinį tepinėlį iš makšties ir gimdos kaklelio;
 - 1.12.10. enterobiozės tyrimą;
 - 1.12.11. elektrokardiografiją;
 - 1.12.12. spirometriją maksimalaus iškvėpimo srovės greičiui (PEF), forsuoto tūrio per pirmą sekundę (FEV1) ir forsuotos gyvybinės plaučių talpos (FVC) reikšmėms vertinti;
 - 1.12.13. pulsoksimetriją.

1.13. Paslaugos, kurių metu atliekami laboratoriniai tyrimai:

Paslaugos pavadinimas	Kam skirta programa	Atliekami tyrimai
Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga	Asmenims naudojantiems antikoagiantais (Warfarinum, Acenocoumardum)	12 kartų per metus Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas, Protrombino laiko (INR) nustatymas.
Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga	Asmenims sergantiems cukriniu diabetu	Kartą per ketvirtį (kas 3 mėn)
Fiziologinio	Nėščiosioms	Iki 12 savaičių nėštumo laikotarpiu

nėštumo priežiūra		atliekama: nėščiosios kraujo grupės ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas, Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė, Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR), Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų.
Prieš planinę operaciją atliekami tyrimai	Asmenims prieš planinę operaciją	Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją, kai yra raštiškas nukreipimas su nurodyta operacijos data ir gydytojo spaudu, bei parašu – protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas, Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas, Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas.

1.14. Įstaigos Psichikos sveikatos centre pacientams pirminio lygio psichikos sveikatos paslaugas teikia gydytojai psichiatrai, psichologai, psichikos sveikatos slaugytojos bei socialiniai darbuotojai;

1.16. Įstaigos nedarbo metu nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą pagal sutartį vykdo VšĮ Biržų ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyrius.

II. NEMOKAMOS PREVENCINĖS PROGRAMOS:

Prevencinė programa	Kam skirta programa	Programos priemonės
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa.	Moterims nuo 25 iki 60 metų	Kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Gavus jo rezultatus gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa.	Moterims nuo 50 iki 69 metų	Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis krūtų tyrimas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti (atvykus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos.
Priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	Vyrams nuo 50 iki 75 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu	Kartą per 2 metus išskyrus atvejus, kai: - vyrų iki 59 metų (įimtina) PSA kiekis ≤ 1 ng/ml paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus; - vyrų nuo 60 metų PSA kiekis ≤ 2 ng/ml – paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus.
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa	Vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65	Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. Jei gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia pacientą į specializuotus centrus išsamiau iširti, o

	metų	prireikus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, kad vieną kartą per metus nemokamai gali būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos grupei.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	Asmenims nuo 50 iki 74 metų	Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduos siuntimą pas gydytoją specialistą. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai objektyviai patvirtinti storosios žarnos vėžio diagnozę
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa	Vaikams nuo 6 iki 14 metų	Vaikų dantis silantais gali padengti gydytojai odontologai arba burnos higienistai, dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų finansavimo

Svarbu: **Nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams prisirašiusiems prie VŠĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos gali būti teikiamos tik pateikus pasą arba tapatybės kortelę (arba gimimo liudijimą), o registruotiems darbo biržoje ir galiojančią darbo biržos pažymėjimą.**

III. PROFILAKTINIAI SKIEPAI

Skiepai – efektyvi profilaktinė priemonė tiek vaikams, tiek suaugusiems. Poliklinikoje skiepijama skiepų kabinete, ambulatorijose ir medicinos punktuose – procedūriniame kabinete:

- apžiūrėjus šeimos, vaikų ar vidaus ligų gydytojui;
- asmeniui (globėjui) raštiškai sutikus;
- jei vakcina mokama - sumokėjus už vakciną ir injekciją bei pateikus apmokėjamą patvirtinantį kvitą vakcinaciją atliekančiai bendrosios praktikos slaugytojai;
- poliklinikoje išduodami skiepijimų pasai.

VŠĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje **nemokamai skiepijami:**

- **suaugusieji** pagal valstybės finansuojamas ir patvirtintas imunoprofilaktines programas, vadovaujantis „Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPI) tvarka“, nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-471 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais);
- **vaikai** pagal „Lietuvos Respublikos vaikų nacionalinį profilaktinių skiepijimų kalendorių“, patvirtintą Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-1101 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais).

NEMOKAMAI SEZONINE GRIPO VAKCINA SKIEPIJAMI:

- 65 m. ir vyresni asmenys;
- asmenys, sergantys lėtinėmis (širdies kraujagyslių, plaučių ligomis, bronchine astma, metabolinėmis, inkstų ligomis, cukriniu diabetu, asmenims, kuriems yra imunodeficitinė būklė) ligomis;
- dirbantys medicinos įstaigose;
- asmenys, gyvenantys socialinėse globos ir slaugos įstaigose;

- nėščiosios.

NEMOKAMAI DIFTERIJOS-STABLIGĖS VAKCINA SKIEPIJAMI

- vyresni nei 26 metų amžiaus asmenys kas 10 metų.

NEMOKAMAI PNEUMOKOKINE POLISACHARIDINE KONJUGUOTA VAKCINA SKIEPIJAMI

Vaikai (2–18 metų amžiaus), jei neskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos anksčiau):

1. sergantys bronchų astma (J45–J46), cistine fibroze (E84), bronchektazine liga (J47);
2. sergantys cerebriniu paralyžiumi (G80), mioneuralinių jungčių ir raumenų ligomis (G70–G73);
3. turintys įgimtas širdies ydas (Q20–Q25);
4. sergantys cukriniu diabetu (E10–E14);
5. sergantys navikais (C00–D48);
6. sergantys lėtinėmis inkstų ligomis (N04, N18);
7. vaikai, kuriems atliekama hemodializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);
8. sergantys lėtinėmis kepenų ligomis (K71.3–K71.7, K73–K74, Q44.2);
9. esant imunosupresinėms būklėms: turintys imunodeficitą (D80–D84), sergantys reumatinėmis ligomis (M05–M08, M30–M36, M79.0), po kraujodaros kamieninių ląstelių ar žmogaus organų, ar audinių transplantacijos (Z94), esant įgimtai ar įgytai asplenijai (D73.0, Q89.01));
10. vaikai su kochleariniais implantais (Z96.2);
11. sergantys ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21);
12. asmenys, sergantys širdies nepakankamumu (I50) (nuo 2019 m. sausio 1 d.)

Suaugusieji (vyresnių nei 18 metų):

1. sergantys lėtine inkstų liga, kai glomerulų filtracijos greitis (GFG) $<30\text{ml}/1,73\text{m}^2$ (N18.4–N18.5);
2. sergantys nefroziniu sindromu (N04);
3. asmenys, kuriems atliekama dializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);
4. sergantys navikais (C00–C96, D46–D47);
5. asmenys po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (Z94.8);
6. asmenys po parenchiminių organų transplantacijos (Z94);
7. sergantys reumatinėmis ligomis (M02–M08, M13, M30–M36, M45, M46);“.
8. sergantys kepenų fibroze ir ciroze (K74)
9. asmenys, kuriems nustatyta hiposplenizmas ar įgimta asplenija (D73.0, Q89.01);
10. asmenys, kuriems nustatytas cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas (G96.0);
11. asmenys su kochleariniais implantais (Z96.2);
12. sergantys ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21);
13. asmenys, kuriems nustatyta jatrogeninė imunosupresija (D89.8).
14. asmenys, kuriems nustatytas imunodeficitas su vyraujančiais antikūnų pakitimais (D80), kombinuoti imunodeficitai (D81), imunodeficitas kartu su kitais pagrindiniais sutrikimais (D82), įprastas kintamasis imunodeficitas (D83) arba kiti imunodeficitai (D84).
15. asmenys, sergantys:
 - 15.1. 1 tipo cukriniu diabetu (E10);
 - 15.2. kitu patikslintu cukriniu diabetu (E13);
 - 15.3. 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jiems planuojama chirurginė operacija;
 - 15.4. 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jie yra vyresni nei 65 metų ir jiems papildomai nustatyta 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis (E11.71), 2 tipo cukrinis diabetas su inkstų komplikacija (E11.2), 2 tipo cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija (E11.5), kardiomiopatija (I42), kardiomiopatija, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (I43), bent viena iš širdies išeminių ligų (I20–I25), širdies nepakankamumas (I50) arba bent viena iš atitinkamų lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų (J40–J43, J45–J47);
16. asmenys, sergantys kita lėtine obstrukcine plaučių liga (J44).

Vadovaujantis SAM 2015-10-08 įsakymu Nr. V-1130 „Dėl pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo” su pakeitimais.

NEMOKAMAI VAKCINA NUO ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO (ŽPV) SKIEPIJAMOS

1. Mergaitės, kurioms 2016 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau sueis 11 metų.

Vadovaujantis SAM 2015-06-12 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl LR vaikų profilaktinių skiepimų kalendoriaus patvirtinimo“, 8p.

MOKAMA INJEKCIJA Į RAUMENIS BEI VAKCINA YRA :

- pacientams, prisirašiusiems kitoje įstaigoje;
- neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu;
- pageidaujantys papildomų (nekompensuojamų iš PSDF lėšų) skiepų.

MOKAMŲ VAKCINŲ KAINŲ TEIRAIKĖS SKIEPŲ KAB. TEL. 8 652 07855

Šiuo metu VšĮ Biržų rajono sav. poliklinikoje skiepijama šiomis LR registruotomis vakcinomis:

Inaktyvuota Hepatito A vakcina (nuo 1 metų iki 15 metų) Havrix	1 dozėje (0,5 ml) yra 720 ELISA vienetų	Rekomenduojama skiepyti vaikus, ruošiamus į vaikų kolektyvą (darželį, mokyklą). Vaikai ir suaugę skiepijami planuojant keliauti į kraštus, kuriuose yra paplitęs Hepatitas A. Rekomenduojamos 2 vakcinų dozės. Geriausia pirmą dozę įskiepyti mažiausiai prieš vieną mėnesį iki numatomo kolektyvo lankymo pradžios ar kelionės. Antroji dozė skiepijama po 6-12 mėnesių, jei to nebuvo padaryta, ją galima įskiepyti ir vėliau.
Inaktyvuota Hepatito A vakcina (nuo 16 metų ir suaugusiems) Avaxim	1 dozėje (0,5 ml) yra Hep A 160 antigeninių vienetų	
Inaktyvuota erkinio encefalito vakcina (nuo 1 metų iki 15 metų) Tico vac	1 dozėje (0,25 ml) yra 1,2 g inaktyvuoto erkinio encefalito viruso	Vaikai skiepijami nuo vienerių metų amžiaus. Pradiniam skiepimui įskiepijamos trys vakcinų dozės. Pirmą palaikomoji dozė skiepijama praėjus trejiems metams nuo trečios vakcinų dozės įskiepijimo. Kitos palaikomosios dozės skiepijamos kas 5 m.
Inaktyvuota erkinio encefalito vakcina (nuo 16 metų ir suaugusiems) Tico vac	1 dozėje (0,5 ml) yra 2,4 g inaktyvuoto erkinio encefalito viruso	Suaugusių skiepimo schema tokia pati kaip ir vaikų.
Meningokokinė B grupės vakcina (rDNR, komponentinė adsorbuota) (nuo 2 mėn. amžiaus) Bexsero	1 dozė – 0,5 ml	Meningokokinę infekciją sukelia bakterija B grupės Neisseria meningitidis. Bexsero skiriamas vaikams nuo 2 mėn. amžiaus, paaugliams bei suaugusiems.
Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina(13 – valentė, adsorbuota) (kūdikams nuo 2 mėn. ir vaikams iki 17 metų amžiaus, t. p. suaugusiems vyresniems nei 50 metų amžiaus) Prevenar – 13	1 dozė – 0,5 ml	Pneumokokas dažnai sukelia bakterinį vidurinės ausies uždegimą, plaučių uždegimą, sepsį, meningitą. Rekomenduojama skiepyti 4 vakcinų dozėmis 2, 4, 5 mėnesių amžiaus kūdikius, o antrais gyvenimo metais reikia įskiepyti ketvirtą dozę. Šia vakcina rekomenduojama skiepyti suaugusius vyresnius nei 50 metų amžiaus, skiriama 1 vakcinų dozė.
Gyva susilpninta vėjaraupių vakcina (nuo 1 metų vaikams ir suaugusiems) Varilrix	Sudėtyje – Varicella zoster viruso vienetų 2000. 1 dozė – 0,5 ml	Skiepijami nesirgę vėjaraupiais. Skiepijama 2 vakcinų dozėmis su minimaliu 4 savaičių intervalu tarp vakcinų dozių įskiepijimo.
Rekombinantinė	1 dozėje (1,0 ml) yra	Skiepijami neskiepyti, nesirgę asmenys.

Hepatito B vakcina (vaikams nuo 16 metų ir suaugusiems) Engerix	paviršinio Hep. B antigeno 20 g	Skiriamos trys dozės.
Kombinuota hepatito A ir hepatito B vakcina (vaikams nuo 16 metų ir suaugusiems) Twinrix	1 dozėje (1,0 ml) yra HA inaktyvuoto antigeno 720 ELU, HBs 20 g	Skiepijami neskiepyti, nesirgę asmenys. Skiriamos trys dozės.
Adsorbuota difterijos, stabligės ir inaktyvinto poliomieliito vakcina (suaugusiems) Dultavac	1 dozė – 0,5 ml	Revakcinuojami suaugę, kuriems reikalinga ir poliomieliito revakcinacija.
Gripo vakcina (iš virionų fragmentų, inaktyvuota) (vaikams ir suaugusiems) Vaxigrip	Antigenų štamai – atitinkantys PSO rekomendacijas Šiaurės pusrutuliu ir Europos Sąjungos nurodymus 2015/2016 sezonui. 1 dozė – 0,5 ml	Skiepijami vaikai nuo 6 mėn. Vaikams įskiepijama 0,25 ml. Vaikams iki 9 metų, skiepijant pirmą kartą, skiepijamos 2 dozės, tarp kurių būtina mažiausiai vieno mėnesio pertrauka. Vėliau skiepijama kasmet prieš gripo sezoną, įskiepijant vieną gripo vakcinės dozę. Suaugusieji skiepijami įskiepijant vieną vakcinės dozę.
Žmogaus papilomos viruso vakcina Cervarix	Viruso 16,18 tipai. 1 dozė – 0,5 ml	Apsaugo nuo gimdos kaklelio vėžio. Kadangi dažniausiai užsikrečia lytiniu keliu, todėl rekomenduojama paaugles skiepyti iki lytinio gyvenimo pradžios nuo 10 metų ir moterims . Skiepijamos 3 dozės. Antroji dozė skiepijama po 1 mėn. po pirmos dozės, o trečioji – po 5 mėn. po antros dozės. NEMOKAMAI skiepijamos 11 metų mergaitės . Skiepijimo schema: 2 dozės (tarp pirmos ir antros dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis).
Rotavirusinio gastroenterito vakcina Rotarix	Gyvo susilpninto žmogaus rotaviruso ne mažiau kaip geriamų dozių skiepijimo schema). 1 dozė – 1,5 ml	Skiepijami vyresni nei 6 savaičių kūdikiai. Vakcinacijai skiriamos 2 dozės su nemažiau kaip 4 savaičių pertrauka tarp jų. Vakcinaciją būtina užbaigti iki 5,5 mėn. amžiaus. Pradėjus skiepyti viena iš turimų gastroenterito vakcinų, būtina ta pačia ir baigti.

DANTŲ PROTEZAVIMAS

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika protezavimo paslaugas teikia **tik prie poliklinikos prisirašiusiems asmenims**, kuriems nustatytas dantų protezavimo reikiamumas.

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. galioja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

- asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
- vaikai;
- nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos **kompensuojamos** iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet **ne daugiau kaip:**

- pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 463,13 Eur;
- pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnis nei 12 mm storio – iki 1424,99 Eur (nustato antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumas);

- vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikiniais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 236,36 Eur;
- vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais.– iki 1424,99 Eur (nustato antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumas).

Šiuo metu, poliklinika yra sudariusi sutartis su trimis protezus gaminančiomis įmonėmis, pagal kurias 2019 m. kovo 1 d. VšĮ Biržų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.1-3 patvirtintos kainos.

PROTEZŲ (ĮSKAITANT PROTEZAVIMO PASLAUGAS) KAINYNAS		
Kodas	Atspaudų pagaminimui, koregavimui	Protezo kaina, eur.
1	Individualus šaukštas	16
2	Diagnostinis modelis	4
3	Plastmasinis vainikėlis	56
4	Dantų protezų smulki pataisa (kabliukas, danties įstatymas)	33
5	Dantų protezo bazės pataisa	56
	Nuimami protezai	
6	Plokštelinis protezas (1-4 dantų)	133
7	Plokštelinis protezas (daugiau nei 4 dantys)	184
8	Kosmetinis termoplastinis plokštelinis protezas (1-2 dantys)	178
9	Kosmetinis termoplastinis plokštelinis protezas (3-4 dantys)	267
10	Termoplastinis plokštelinis protezas	384
11	Lanko atraminis protezas	444
	Lieti protezai	
12	Lietas vienašakis kultinis įklotas	38
13	Lietas dvišakis ar trišakis kutinis įklotas	44
14	Lietas vainikėlis be apdailos	89
15	Lietas vainikėlis su akrilikos (plasmės) apdaila	111
16	Lietas vainikėlis su daline keramikos (porceliano) apdaila	156
17	Metalo keramikos vainikėlis	200